



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Nguyễn Văn Quý, Khu Phố 1, Phường Tân Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

HOTLINE: 028 3773 0699

Bộ giải pháp


QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN

SẦU RIÊNG





1. GIAI ĐOẠN SAU THU HOẠCH - PHỤC HỒI SỨC KHỎE CÂY TRỒNG

DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Xử lý cỏ dại	1,5 lít Fasfix 150 SL (mùa khô) hoặc 700 - 800 g Fastoxy 32 WP hoặc 1,4 lít Diusinate 268 SC (mùa mưa)	
Rầy xanh / rầy nhày	65 g Gà nòi 95 SP + 450 ml Sếu Đỏ 3 EC hoặc 250 ml Saimida 100 SL + 480 ml SK Enspray 99 EC hoặc 240 g Brimgold 200 WP + 480 ml SK Enspray 99 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Bù xè, xén tóc, đục thân	Sago - Super 3 GR hoặc Gà nòi 4 GR (khoét lỗ nhét thuốc)	
Mọt đục cành	400 ml - 500 ml Sagosuper 20 EC + 450 ml Fenbis 25 EC hoặc 400 ml - 500 ml Sagosuper 20 EC + 400 ml Comda 250 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Tuyến trùng	Rải 25 - 50 g Sagofort 10 GR /gốc	
Nhện đỏ	500 ml - 1 lít SK ENSPRAY 99 EC hoặc 400 ml Kingspider 93 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Bệnh đốm lá, nấm hồng và cháy lá	200 - 300 ml Saipora super 350 SC hoặc 600 - 900 g Mexyl MZ 72 WP (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Xi mù, vàng lá, thối rễ	Tưới 40 - 50 ml Sagoflu Pro 687.5 SC /gốc, kết hợp phun 400 - 500g Alpine 80 WG (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày). Quét 30 g Mexyl MZ 72 WP /lít nước lên vết xi mù (nếu có)	
Kích đột ra mạnh, xanh lá, phục hồi sức khỏe của cây trồng	500 - 600 ml Tano 601 luân phiên 400 - 500 g Fertigonia 18 - 18 - 18 (mỗi loại phun 2 lần, cách nhau 15 - 20 ngày)	
Phát triển rễ, cải tạo đất, nâng pH	Bón NPK 20 - 20 - 15 . Rải vôi và kết hợp bón 150 kg/ha SPC - Hữu cơ và 40 - 80 kg/ha chế phẩm Bima	



2. GIAI ĐOẠN KÍCH THÍCH TẠO MẦM HOA (Xử lý vào cuối đợt thứ hai)

DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Rầy xanh / rầy nhảy	65 g Gà nòi 95 SP + 450 ml Sếu Đỏ 3 EC hoặc 250 ml Saimida 100 SL + 480 ml SK Enspray 99 EC hoặc 240 g Brimgold 200 WP + 480 ml SK Enspray 99 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày).	
Nhện đỏ	500 ml - 1 lít SK Enspray 99 EC hoặc 400 ml Kingspider 93 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Tuyến trùng	Rải 25 - 50 g Sagofort 10 GR/gốc	
Bệnh nấm hồng	1 lít Vanicide 5 SL (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Xi mù, vàng lá, thối rễ	Tưới 40 - 50 ml Sagoflu Pro 687.5 SC/gốc, kết hợp phun 400 - 500 g Alpine 80 WG (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày). Quét 30 g Mexyl MZ 72 WP/lít nước lên vết bệnh xi mù (nếu có)	
Phân bón	Bón phân có hàm lượng lân cao và bón phân hữu cơ có Trichoderma đối kháng Phytophthora và Fusarium	
Làm già lá đồng loạt, tạo mầm hoa	Bón 2 kg SPC - MKP (52 - 34) (2 lần, cách nhau 7 ngày)	




3. GIAI ĐOẠN SIẾT NƯỚC, CHUYỂN QUA GIAI ĐOẠN SINH SẢN

DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Rầy xanh / rầy nhảy	65 g Gà nòi 95 SP + 450 ml Sếu Đỏ 3 EC hoặc 250 ml Saimida 100 SL + 480 ml SK Enspray 99 EC hoặc 240 g Brimgold 200 WP + 480 ml SK Enspray 99 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Nhện đỏ	0,8 - 1 kg Sulox 80 WP hoặc 400 ml Kingspider 93 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Bệnh cháy lá, thán thư, nấm hồng, đốm lá	200 ml Sagoperfect 320 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Xi mù, vàng lá, thối rễ	Tưới 40 - 50 ml Sagoflu Pro 687.5 SC/gốc, kết hợp phun 400 - 500 g Alpine 80 WG (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Tháo nước, siết nước, phủ bạt. Tiến hành tạo mầm hoa, kích thích ra hoa. Đánh thức mầm ngủ, chống thụt mắt của	Sau khi phủ bạt 1 ngày tiến hành phun 1,5 kg Sài Gòn P1 15 WP. Sau 1 tuần pha 240 ml SPC - NPK 5 - 5 - 15, kết hợp 150 - 200 ml Tano 606 để tạo mầm hoa, và kéo mắt của. 300 - 400 ml SPC Kali Silic (phun khi mắt của mới nhú trên 60% và dài 1.0 - 2.0 cm)	

Trong quá trình siết nước, quan sát nếu thấy hiện tượng cây đi đọt thì tiến hành sử dụng sản phẩm chặn đọt

Xử lý khi cây chưa ra đọt, trước lúc xổ nhụy.

Pha 1 lít **Saizole 5 SC** + 240 ml **Animat 40 SL**. Nếu cây ra đọt, muốn chặn đọt pha 1 lít **Saizole 5 SC** + 480 ml **Animat 40 SL**.



4. GIAI ĐOẠN RA HOA, XỔ NHỤY (Tiến hành hỗ trợ thụ phấn hoa để tăng đều quả và chất lượng quả)

Không nên sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật và phân bón, không tưới hoặc phun lên tán lá cây trong giai đoạn bông đang thụ phấn. **Tránh gây sốc cây**. Các biện pháp phòng trị sâu, bệnh, cung cấp dinh dưỡng và chặn đọt đều được thực hiện vào giai đoạn trước và sau giai đoạn cây đang ra hoa, xổ nhụy.


DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Xổ nhụy	Tỉa bông (cành cấp 1, cấp 2, chùm bông), bỏ bông phướn. Hỗ trợ thụ phấn nhân tạo (từ 18 giờ đến 22 giờ)	
Chế độ nước	Tưới ít	

5. GIAI ĐOẠN NUÔI BÔNG, TĂNG ĐỀU TRÁI

DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Sâu ăn bông	200 ml Sapen Alpha 5 EC (chỉ xử lý khi cần thiết)	
Bệnh cháy lá, bệnh khô bông và bệnh héo bông	200 - 300 ml Saipora super 350 SC hoặc 200 ml Sagoperfect 320 SC	
Nuôi bông, tăng đều trái, hạn chế rụng bông, rụng trái non	150 - 200 ml Tano 606 (2 lần, cách nhau 7 ngày)	



6. GIAI ĐOẠN TRÁI

DỊCH HẠI	GIẢI PHÁP - LIỀU LƯỢNG PHA CHO 1 PHUY 200 LÍT NƯỚC (NẾU PHUN QUA LÁ) VÀ CHO 20 LÍT NƯỚC (NẾU TƯỚI GỐC)	
Xử lý cỏ dại	1,5 lít Fasfix 150 SL (mùa khô) hoặc 700 - 800 g Fastoxy 32 WP hoặc 1,4 lít Diusinate 268 SC (mùa mưa)	
Sâu đục trái, rệp sáp	130 g Gà nòi 95 SP + 450 ml Sếu đỏ 3 EC hoặc 300 ml Sagosuper 20 EC + 200 ml Comda 250 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	 
Nhện đỏ, gần thu hoạch (cách thu hoạch 5 - 7 ngày)	400 ml Kingspider 93 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	  
Bù xè, xén tóc, đục thân, đục cành	Sago super 3 GR hoặc Gà Nòi 4 GR (khoét lỗ nhét thuốc)	  
Mọt đục cành	400 ml - 500 ml Sagosuper 20 EC + 450 ml Fenbis 25 EC hoặc 400 ml - 500 ml Sagosuper 20 EC + 400 ml Comda 250 EC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	
Bệnh cháy lá, thán thư và nấm hồng	200 - 300 ml Saipora super 350 SC hoặc 200 ml Sagoperfect 320 SC (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	  
Xi mù thân, vàng lá, thối rễ, thối trái	Tưới 40 - 50 ml Sagoflu Pro 687.5 SC /gốc, và kết hợp phun 400 - 500 g Alpine 80 WG (2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày)	  
Nuôi trái, tăng cường sức khỏe cây, xanh gai, chống nứt gai. Giúp trái phát triển kích thước, tăng trọng lượng, chống sượng trái và nhão cơm	Bón NPK . Bón gốc 150 kg/ha SPC - Hữu cơ và 40 - 80 kg/ha chế phẩm Bima . Kết hợp phun 500 g Fertigonía 18 - 18 - 18 luân phiên 500 ml Tano 601 + 200 g SPC - Cal luân phiên 250 - 300 ml SPC - NPK 5 - 5 - 15	 



GHI CHÚ:

- Trên đây là hướng dẫn sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, Kích thích sinh trưởng và Phân bón lá theo từng giai đoạn phát triển của cây.
- Hướng dẫn này mang tính tham khảo, khi áp dụng, chủ vườn cần kiểm tra xem xét tình hình sức khỏe của cây, thời tiết và môi trường đất, nước để áp dụng cho phù hợp. Phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch 10 - 15 ngày.



WEBSITE



YOUTUBE



FACEBOOK

ISO 14001:2015
ISO 9001 : 2015
ISO/IEC 17025



ĐƠN NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN

